

1

Paso 1: ¿Es posible que el paciente haya estado en contacto con un alérgeno conocido?:
Sí (Continúe) No (PARE)



Marque todas las áreas abajo en las que usted o su hijo están teniendo síntomas.



Síntomas graves:

☐ Estado mental:

- Ansiedad
- Confusión
- Sensación de fatalidad



☐ Cara:

- Hinchazón de cara
- Hinchazón de lengua



☐ Garganta:

- Dificultad para respirar
- Dificultad para tragar
- Opresión



☐ Corazón:

- Mareos
- Desmayos
- Palidez
- Pulso débil



☐ Pulmones:

- Tos
- Respiración ruidosa
- Falta de aire



☐ Estómago:

- Diarrea intensa
- Vómitos repetidos

Síntomas leves:

☐ Nariz:

- Picazón
- Secreción nasal
- Estornudos



☐ Boca:

- Picazón



☐ Estómago:

- Náusea
- Malestar estomacal



☐ Piel:

- Picazón
- Urticaria leve



☐ Piel:

- Sarpullido en todo el cuerpo
- Enrojecimiento en todo el cuerpo



2

Paso 2: ¿Cuántas áreas marcó?

Si usted marcó CUALQUIER categoría grave arriba:
Administre el autoinyector de epinephrine

Consulte las instrucciones en la parte de atrás

Deje que la persona se siente o se recueste de lado (si está vomitando)

Si no se marcaron áreas graves:
NO administre epinephrine



Si marcó DOS O MÁS categorías leves arriba:
Administre el autoinyector de epinephrine

Consulte las instrucciones en la parte de atrás

Deje que la persona se siente o se recueste de lado (si está vomitando)

Si se marcó una a menos áreas leves:
NO administre epinephrine




3

Paso 3: Monitoree de cerca a su hijo


Llame al 911. Si los síntomas empeoran o no mejoran después de 5 minutos, administre epinephrine nuevamente mientras espera que llegue ayuda médica.



EpiPen and EpiPen Jr.




Amneal



SYMJEPI



AUVI-Q



Teva



Epinephrine es un medicamento que salva vidas usado para reacciones anafilácticas (alérgicas graves) y se puede administrar a través de la ropa.

Efectos secundarios: inestabilidad/temblores, aturdimiento, aumento del ritmo cardíaco, ansiedad, náuseas/vómitos, sudoración, palidez

Almacenamiento: temperatura ambiente, mantener alejado del calor y del frío (evitar dejarlo en el auto)

Cómo descartar el inyector: el inyector puede descartarse en un recipiente para objetos punzantes o en un recipiente de bordes duros como un envase de detergente para ropa antes de tirarlo a la basura

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: el contenido de este documento es para promover la comprensión general de los temas médicos descritos en esta publicación y es solo para fines informativos. Dicha información no debe sustituir la formación clínica, la experiencia o el criterio de un profesional de atención médica. Las personas y sus familias no deben usar esta información como sustituto al consejo u orientación del profesional médico, terapéutico o de atención médica.

NO SE DAN GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS POR LEY CON RESPECTO AL CONTENIDO.