

A MI HIJO/A SE LE ADMINISTRÓ UN ANTIBIÓTICO. ¿AHORA QUÉ SIGUE?

Los antibióticos pueden ser muy útiles para tratar infecciones causadas por bacterias, como la amigdalitis estreptocócica o las infecciones de las vías urinarias. Sin embargo, es importante que siga las instrucciones de su proveedor de atención médica para ayudar a su hijo/a a tomar los antibióticos de manera correcta y mantenerlo/a seguro/a. Aquí hay algunos consejos para ayudar a que su hijo/a obtenga el máximo beneficio del medicamento.


- 1. Escuche a su equipo de atención médica.** Es posible que deba cambiar o suspender los antibióticos de su hijo/a entre 1 y 2 días después de la consulta, especialmente si le realizaron pruebas durante dicha consulta.
- 2. ¿Qué sucede si mi hijo/a no toma el antibiótico recetado?** Tomar antibióticos puede ser difícil para algunos niños. Escanee el código QR que aparece a continuación para obtener consejos sobre cómo ayudar a su hijo/a a tomar los medicamentos.
- 3. Mi hijo/a se siente mejor, ¿ahora qué sigue?** Incluso si su hijo/a se siente mejor, asegúrese de que tome todas las dosis del antibiótico. Escanee el código QR que aparece a continuación para saber por qué.
- 4. No guarde los antibióticos que sobren.** No debe guardarlos para usarlos más adelante. Tomar antibióticos viejos puede ser peligroso. No comparta antibióticos con nadie. Escanee el código QR a continuación para saber cómo deshacerse de los medicamentos de forma segura.
- 5. ¡Ayuda! Mi hijo/a no mejora.** Dependiendo de la infección que tenga, su hijo/a debe comenzar a sentirse mejor después de 2 a 3 días de la administración de antibióticos. Si su hijo/a se siente peor o no puede tomar sus antibióticos, comuníquese con su equipo de atención médica.
- 6. ¿A qué efectos secundarios debo estar atento?** Muchos niños tienen efectos secundarios leves como sarpullido, mareos, malestar estomacal, infecciones por hongos y diarrea.

Obtenga atención médica de emergencia si su hijo/a tiene:

- Hinchazón de labios
- Sibilancias
- Dificultad para respirar
- Urticaria
- Diarrea severa

Estos son signos de una reacción alérgica. Es posible que su hijo/a necesite un antibiótico distinto.

Para obtener más información,
escanee el código QR o visite:
cmkc.link/when-to-use-antibiotics



**CHILDREN'S MERCY
ANTIMICROBIAL
STEWARDSHIP
PROGRAM**

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
El contenido de este documento tiene como fin el promover la comprensión del tema de salud descrito en esta publicación y su objetivo es informativo únicamente. Esta información no reemplaza la capacitación clínica, la experiencia o el criterio de un profesional de atención médica. Las personas y sus familias no deben usar esta información como sustituto del asesoramiento y la orientación médica, terapéutica o de atención de salud de un profesional. NO SE OFRECE GARANTÍA ALGUNA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA POR LEY, AL RESPECTO DEL CONTENIDO.
Derechos de autor © 2024 The Children's Mercy Hospital. Todos los derechos reservados. 24-ID-2606 03/24